


## JE SUIS PERSONNE-CONTACT À RISQUE \* Que dois-je faire ?

La prise en charge et les consignes d'isolement des personnes-contacts à risque varient selon leur statut vaccinal, l'existence d'une immunodépression grave et l'existence d'un antécédent d'infection.



\* Si mon test immédiat ou de J7 est positif je deviens un cas confirmé et suis la conduite à tenir indiquée.

<sup>1</sup> Une personne atteinte d'une immunodépression grave présente une affection la rendant éligible à une 3e dose de primo-vaccination, même si celle-ci a déjà été administrée.

<sup>2</sup> Tests par amplification moléculaire (RT-PCR, RT-LAMP), TAG naso-pharyngé ou sérologie ou sérologie de rattrapage datant de moins de 2 mois.

<sup>3</sup> Schéma vaccinal complet : toute personne ayant reçu un schéma complet de primo-vaccination depuis au moins 7 jours (vaccins Cominarty/Pfizer, Moderna, AstraZeneca/Vaxzeria ou Covishield) ou au moins 4 semaines (vaccin Janssen).

<sup>4</sup> Pour la prise en charge des cas positifs ou négatifs, se référer au logigramme « Prise en charge des cas possibles, quel que soit leur statut vaccinal ».